



Алгоритм действий медицинского персонала при обращении взрослого населения по поводу присасывания клеща

Обращение в стационар или поликлинику на ул. Летняя

Не прикреплен к поликлинике
ЦГКБ



Снятие клеща в лечебном учреждении по месту жительства в рабочее время или круглосуточно в ГКБСМП по адресу: г. Калининград, ул. Александра Невского д. 90

Прикреплен к поликлинике
ЦГКБ



Снятие клеща:
- врач-хирург поликлиники (ул. Летняя, 3Б, в будние дни с 8:00 до 14:00, обращение через регистратуру поликлиники) или
- дежурный врач-травматолог приемного отделения (ул. Летняя, 3А, приемное отделение для взрослого населения, в будние дни с 9:00 до 15:00, кабинет № 173). В остальное время - в круглосуточный травмпункт ГКБСМП по адресу: г. Калининград, ул. Александра Невского д. 90.



Дежурный врач-хирург поликлиники, дежурный врач-травматолог приемного отделения

1. Удаляет клеща, не повреждая хоботок

2. Помещает клеща в плотно закрытую чистую емкость (пробирку, контейнер для анализов) с ватно-марлевым влажным тампоном

3. Направляет клеща на исследование

Лаборатория ЦГКБ (ул. Летняя, 3А, кабинет приема анализов, с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, суббота с 8:00 до 9:00)

4. Уточняет прививочный статус, определяет наличие повышенного риска заражения

Привит (полный курс) + одно присасывание клеща



Иммуноглобулин не вводим

Не привит, неполный курс, дефекты в вакцинальном курсе, нет документов о прививках



Привит + многократные укусы или одновременное присасывание нескольких клещей



5. Направляет на проведение экстренной профилактики иммуноглобулином без учета результатов исследования клеща

6. Направляет пострадавшего к врачу-инфекционисту для наблюдения

Поликлиника ул. Летняя, 3Б, кабинет № 121 в будние дни с 8:00 до 20:00

7. Подает экстренное извещение (в течение 2 часов) с указанием:

места присасывания клеща

прививочного анамнеза

экстренной иммунизации

Обращение в ВОП «Прибрежный», «Октябрьский»

Снятие клеща в ГКБСМП по адресу: г. Калининград, ул. Александра Невского д. 90

Экстренная иммуноглобулинопрофилактика проводится в течение 72 часов после снятия клеща.

Дежурный врач-хирург поликлиники, дежурный врач-травматолог приемного отделения указывает в рекомендациях:

- однократное введение противоклещевого иммуноглобулина с дозировкой из расчета 0,1 мл на 1,0 кг массы тела,
- отсутствие противопоказаний.

Введение иммуноглобулина проводится в поликлинике в кабинете № 206 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 при наличии рекомендаций от дежурного врача-хирурга или врача-травматолога.